

Blondine

AGRIA x 87F357. 5

Γενετιστής: SICA Bretagne-Plants et Cecab

Εγγραφή : 2009

Αποκλειστικός κάτοχος: Gorex SA

Διακριτικά χαρακτηριστικά

ΚΟΝΔΥΛΟΣ	<ul style="list-style-type: none">Μακρύς ΩοειδήςΡηχά μάτιαΚίτρινη ΕπιδερμίδαΚίτρινη σάρκα
ΦΥΤΡΟ	<ul style="list-style-type: none">Κόκκινο πορφυρό
ΑΝΘΟΣ	<ul style="list-style-type: none">Λευκό
ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ	<ul style="list-style-type: none">Μέση

Καλλιεργητικά χαρακτηριστικά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ	<ul style="list-style-type: none">105 % των αποτελεσμάτων CTPS (Centre Technique Permanent de la Selection)
CALIBRAGE	<ul style="list-style-type: none">Υψηλό ποσοστό μεγάλων κονδύλων
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΣ	<ul style="list-style-type: none">Περονόσπορος φύλλων: Σχετικά ευπαθήςΠερονόσπορος κον/λων: Ελαφρά ευπαθήςΑκτινομόκωση: Σχετικά ευπαθήςΙός Υ: Ελαφρά ευπαθήςΝηματώδης RO1-4: Ανθεκτική
ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΝΔΥΛΟΥ	<ul style="list-style-type: none">Σκωριόχρωμη Κηλίδωση: Ελαφρά ευαίσθητηΚοίλη καρδιά: Ελαφρά ευαίσθητηΡωγμές : Ευαίσθητη
ΣΠΑΣΙΜΟ ΦΥΤΡΩΝ	<ul style="list-style-type: none">Ελαφρά ευαίσθητη
ΠΟΙΟΤΗΤΑ	<ul style="list-style-type: none">Γευστική ποιότητα: Ίση της BintjeΚατακράτηση στο μαγείρεμα : πολύ καλήΙκανότητα Αποθήκευσης : Καλή - ελαφρά ευαίθητη στο γλύκισμαΧρωματισμός στο τηγάνισμα : ΔιαυγήςΠεριεκτικότητα σε ξηρά ουσία : 21 με 24 %Πολύ καλή στην επεξεργασία για πατάτες τηγανιτές και τσιπς

Γενικά Χαρακτηριστικά

Μεσοπρώιμη ποικιλία που παράγει μεγάλους κονδύλους μακρούς, ωοειδείς, ομοιόμορφους με κίτρινη επιδερμίδα και σάρκα. Το υψηλό ποσοστό ξηράς ουσίας σε συνδυασμό με την μικρή ευαισθησία σε σακχάρωση της παρέχει πολύ καλή δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για παρασκευή τσιπς και κριπς.



Η καλλιέργεια της BLONDINE



ΣΠΟΡΟΣ

- Διατηρήστε τους κονδύλους στους +2 με +4 βαθμούς κελσίου.
- Πριν φυτέψετε αφήστε τους κονδύλους να εγκληματιστούν
- Μην ξεχάσετε να εφαρμόσετε θεραπεία για Ριζοκτώνια

ΧΩΡΑΦΙ

- Η BLONDINE ταιριάζει πολύ καλά ανεξαρτήτως της υφής του εδάφους

ΕΔΑΦΟΣ

- Οργώστε καλά το έδαφος σε βάθος 20 εκατοστών
- Μην φυτεύετε σε έδαφος καυτό και ξερό

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ για συγκομιδή 45/75 mm

Calibrage	Πυκνότητα / στρέμμα	Αποστάσεις
28/35	4000 με 4500 φυτά	75 x 30 / 90 x 22
35/45	3200 με 3500 φυτά	75 x 38 / 90 x 32
45/50	3000 φυτά	75 x 44 / 90 x 37

ΛΙΠΑΝΣΗ

- Άζωτο 18 με 20 μονάδες/στρέμμα
- Φώσφορο 8 με 12 μονάδες/στρέμμα
- Κάλιο 35 με 40 μονάδες/στρέμμα
- Μαγνήσιο 5 μονάδες/στρέμμα

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ

- Να σέβεστε πάντα την δοσολογία
- Να οργανώνετε τα προγράμματα προστασίας της καλλιέργειας λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις προτάσεις του γεωπόνου και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Συλλέγετε 3 με 4 εβδομάδες μετά την καταστροφή του φυλλώματος.

